

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 327350-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych

Dostawy zestawów przeciwciał oraz odczynników do diagnostyki w zakresie immunohistochemii. L.p. NAZWA OPAK. ILOŚĆ SZT. 1. Monoclonal Rabbit X-HER alpha Clone EP1, 6 ml 6 szt. 2. Monoclon Mo X-H, Progest Receptet, Clone PgR 636 6 ml 6 szt. ...

Termin składania ofert: 2013-08-22

Numer ogłoszenia: 328246 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327350 - 2013 data 13.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, fax. 074 6489746.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Dostawy zestawów przeciwciał oraz odczynników do diagnostyki w zakresie immunohistochemii. L.p. NAZWA OPAK. ILOŚĆ SZT. 1. Monoclonal Rabbit X-HER alpha Clone EP1, 6 ml 6 szt. 2. Monoclon Mo X-H, Progest Receptet, Clone PgR 636 6 ml 6 szt. 3. Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29 6 ml. 4 szt. 4. Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26 6 ml 4 szt. 5. Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone D33 6 ml 3 szt. 6. Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34BE12 6 ml 4 szt. 7. Polyclonal Rb a Hu CD3 6 ml 4 szt. 8. Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26 6 ml 4 szt. 9. Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2 6 ml 3 szt. 10. Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10 6 ml 3 szt. 11. Monoclonal Mo a Hu CD43, Clone DF-T1 6 ml 2 szt. 12. Monoclonal Mo a Hu CD79&, Clone JCB117 6 ml 2 szt. 13. Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124 6 ml 4 szt. 14. Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1 6 ml 6 szt. 15. Monoclonal Mo X-H Cytoker Melanosome HMB-45 6 ml 2 szt. 16. Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6 6 ml 2 szt. 17. Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 6 ml 3 szt. 18. Monoclonal Mo a HU Cytokeratin, Clone MNF 116 1 ml stęż. 1 szt. 19. Polyclonal Rb a S100 6 ml 3 szt. 20. Monoclonal Mo a Vimentin, V9 6 ml 2 szt. 21. Polyclonal Rb a Hu Chromogranin A 6 ml 3 szt. 22. Monoclonal a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14 6 ml 2 szt. 23. Rb a Hu CD117, c-Kit 0,2ml stęż. 2 szt. 24. Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone AE1/AE3 6 ml 4 szt. 25. Polyclonal RB a Hu Prostate Specific Antigen 6 ml 2 szt. 26. Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4 6 ml 2 szt. 27. Monoclonal a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 6 ml 4 szt. 28. Monoclonal a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8 6 ml 4 szt. 29. Monoclonal Mo a Hu Melan-A, Clone A 103 6 ml 2 szt. 30. Monoclonal Mx TTF-1, Clone 8G7G3/1 6 ml 3 szt. 31.

Monoclonal MxH E-Cadherin, Clone NCH-38 6 ml 3 szt. 32. Polyclonal RX-Tdt 6 ml 1 szt. 33. Monoclonal Mx-H Renal Cell Carcinoma, Clone SPM314 6 ml 1 szt. 34. Polyclonal Rb a Hu Kappa Light Chains 6 ml 1 szt. 35. Polyclonal Rb a Hu Lambda Light Chains 6 ml 1 szt. 36. Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin 6 ml 1 szt. 37. Monoclonal Mo a Hu BCL-6 Protein, Clone PG-B6p 6 ml 2 szt. 38. Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12 6 ml 2 szt. 39. Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B 6 ml 2 szt. 40. Monoclonal Mouse X-H CD5, Clone 4C7 6 ml 2 szt. 41. Monoclonal Rabbit X-H Cyklina D1, Clone EP12 6 ml 2 szt. 42. Polyclonal Rb a Helicobater Pylori 6 ml 3 szt. 43. Polyclonal Rb a Glial Fibrillary Acidic Protein 6 ml 1 szt. 44. Monoclonal Mo a Hy Cytokeratin 19, Clone RCK 108 6 ml 2 szt. 45. Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15 6 ml 3 szt. 46. Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23 6 ml 2 szt. 47. Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56c6 6 ml 2 szt. 48. Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTU 6 ml 2 szt. 49. Monoclonal Mo a Hu p63 6 ml 6 szt. 50. Monoclonal a Hu Epidermal Growth Factor Receptor, Clone H11 1 ml stęż. 1 szt. 51. Monoclonal a Synaptophysyna 6 ml 3 szt. 52. Monoclonal a Hu CD15, Clone Carb-3 6 ml 1 szt. 53. Monoclonal a Hu CEA, Clone II-7 6 ml 1 szt. 54. Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3 6 ml 1 szt. 55. Ołówek do obrysowywania tkanek 1 szt. 56. System detekcji-odczynniki niezbędne do wykonywania badań immunohistochemicznych typu bufor o pH6,1 oraz pH9,0 oraz enzym do odkrywania antygenów, bufor do przemywania preparatów w trakcie barwienia oraz odczynniki wywołujące reakcje immunohistochemiczną zakończoną reakcją barwną 5 szt. 57. Kompletny zestaw odczynników do oznaczania statusu receptora HER-2 w skrawkach parafinowych metodą immunohistochemiczną. System farmakodiagnostyczny zawierający wszystkie potrzebne odczynniki (przeciwciało swoiste, wiążące, chromogen DAB, bufory do odkrywania antygeny i płukania) op. 50 testów 4 szt. 58. Bufor do odkrywania antygenów pH9 500 ml 4 szt. Zestaw wizualizujący zawierający wszystkie niezbędne do wykonania reakcji immunohistochemicznej odczynniki. W skład zestawu musi wchodzić: bloker endogennej peroksydazy system wizualizujący wolny od biotyny znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych chromogen DAB i bufor DAB bufor do odkrywania antygenów o pH 9-9x30 ml bufor do odkrywania antygenów o pH 6,1-3x30 ml bufor płuczący 4x1 litr wzmacniacz reakcji mysich 3x40 ml rozcieńczalnik przeciwciał hematoksylina Butelki o objętości 5, 12, 25, 50 ml po 25 szt do jednego zestawu do wizualizacji. Szkiełka adhezyjne (600 szt do jednego zestawu wizualizacyjnego). Wszystkie przeciwciała i odczynniki w formie gotowej do użycia poza: receptor EGFR H11, przeciwciało cytokeratyna MNF 116, przeciwciało CD 117, c-kit bufor do odkrywania przeciwciał o wysokim stężeniu pH9 bufor o niskim pH, bufor o wysokim pH i bufor płuczący Wszystkie odczynniki gotowe do użycia muszą pochodzić od tego samego producenta, muszą być: kompatybilne z systemem detekcji oraz być dostarczone w butelkach opatrzone kodami rozpoznawanymi przez program Autostainer - Link Zestaw farmakodiagnostyczny do oznaczenia ekspresji receptora HER-2 u pacjentów z rakiem sutka i rakiem żołądka powinien być zaaprobowany przez FDA (certyfikat PMA) Wszystkie odczynniki oraz ich procedury barwienia muszą zapewniać możliwość barwienia automatycznego i manualnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odpłatne wydzierżawienie Zamawiającemu aparatu do barwień immunohistochemicznych na czas trwania umowy przetargowej - tj. na okres 12 miesięcy.

W ogłoszeniu powinno być: L.p. NAZWA OPAK. ILOŚĆ SZT. 1. Monoclonal Rabbit X-HER alpha Clone EP1, 12 ml 6 szt. 2. Monoclon Mo X-H, Progest Receptet, Clone PgR 636 12 ml 6 szt. 3. Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29 12 ml 4 szt. 4. Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26

12 ml 4 szt. 5. Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone D33 12 ml 3 szt. 6. Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34BE12 12 ml 4 szt. 7. Polyclonal Rb a Hu CD3 12 ml 4 szt. 8. Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26 12 ml 4 szt. 9. Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2 12 ml 3 szt. 10. Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10 12 ml 3 szt. 11. Monoclonal Mo a Hu CD43, Clone DF-T1 12 ml 2 szt. 12. Monoclonal Mo a Hu CD79&, Clone JCB117 12 ml 2 szt. 13. Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124 12 ml 4 szt. 14. Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1 12 ml 6 szt. 15. Monoclonal Mo X-H Cytoker Melanosome HMB-45 12 ml 2 szt. 16. Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6 12 ml 2 szt. 17. Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 12 ml 3 szt. 18. Monoclonal Mo a HU Cytokeratin, Clone MNF 116 1 ml stęż. 1 szt. 19. Polyclonal Rb a S100 12 ml 3 szt. 20. Monoclonal Mo a Vimentin, V9 12 ml 2 szt. 21. Polyclonal Rb a Hu Chromogranin A 12 ml 3 szt. 22. Monoclonal a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14 12 ml 2 szt. 23. Rb a Hu CD117, c-Kit 0,2ml stęż. 2 szt. 24. Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone AE1/AE3 12 ml 4 szt. 25. Polyclonal RB a Hu Prostate Specific Antigen 12 ml 2 szt. 26. Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4 12 ml 2 szt. 27. Monoclonal a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 12 ml 4 szt. 28. Monoclonal a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8 12 ml 4 szt. 29. Monoclonal Mo a Hu Melan-A, Clone A 103 12 ml 2 szt. 30. Monoclonal Mx TTF-1, Clone 8G7G3/1 12 ml 3 szt. 31. Monoclonal MxH E-Cadherin, Clone NCH-38 12 ml 3 szt. 32. Polyclonal RX-Tdt 12 ml 1 szt. 33. Monoclonal Mx-H Renal Cell Carcinoma, Clone SPM314 12 ml 1 szt. 34. Polyclonal Rb a Hu Kappa Light Chains 12 ml 1 szt. 35. Polyclonal Rb a Hu Lambda Light Chains 12 ml 1 szt. 36. Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin 12 ml 1 szt. 37. Monoclonal Mo a Hu BCL-6 Protein, Clon PG-B6p 12 ml 2 szt. 38. Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12 12 ml 2 szt. 39. Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B 12 ml 2 szt. 40. Monoclonal Mouse X-H CD5, Clone 4C7 12 ml 2 szt. 41. Monoclonal Rabbit X-H Cyklina D1, Clone EP12 12 ml 2 szt. 42. Polyclonal Rb a Helicobater Pylori 12 ml 3 szt. 43. Polyclonal Rb a Glial Fibrillary Acidic Protein 12 ml 1 szt. 44. Monoclonal Mo a Hy Cytokeratin 19, Clone RCK 108 12 ml 2 szt. 45. Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15 12 ml 3 szt. 46. Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23 12 ml 2 szt. 47. Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56c6 12 ml 2 szt. 48. Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTU 12 ml 2 szt. 49. Monoclonal Mo a Hu p63 12 ml 6 szt. 50. Monoclonal a Hu Epidermal Growth Factor Receptor, Clone H11 1 ml stęż. 1 szt. 51. Monoclonal a Synaptophysyna 12 ml 3 szt. 52. Monoclona a Hu CD15, Clone Carb-3 12 ml 1 szt 53. Monoclonal a Hu CEA, Clone II-7 12 ml 1 szt. 54. Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3 12 ml 1 szt. 55. Ołówek do obrysowywania tkanek 1 szt. 56. System detekcji-odczynniki niezbędne do wykonywania badań immunohistochemicznych typu bufor o pH6,1 oraz pH9,0 oraz enzym do odkrywania antygenów,bufor do przemywania preparatów w trakcie barwienia oraz odczniki wywołujące reakcje immunohistochemiczną zakończoną reakcją barwną 5 szt. 57. Kompletny zestaw odczynników do oznaczania statusu receptora HER-2 w skrawkach parafinowych metodą immunohistochemiczną. System farmakodiagnostyczny zawierający wszystkie potrzebne odczynniki (przeciwciało swoiste,wiążące,chromogen DAB,bufory do odkrywania antygeny i płukania) op.50 testów 4 szt. 58. Bufor do odkrywania antygenów pH9 500 ml 4 szt. Zestaw wizualizujący zawierający wszystkie niezbędne do wykonania reakcji immunohistochemicznej odczynniki. W skład zestawu musi wchodzić: bloker endogennej peroksydazy system wizualizujący wolny od biotyny znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych chromogen DAB i bufor DAB bufor do odkrywania antygenów o ph 9-9x30 ml bufor do odkrywania antygenów o ph 6,1-3x30 ml bufor płuczący 4x1 litr wzmacniacz reakcji mysich 3x40 ml

rozcieńczalnik przeciwciał hematoksylina Butellki o objętości 5, 12, 25, 50 ml po 25 szt do jednego zestawu do wizualizacji. Szkiełka adhezyjne (600 szt do jednego zestawu wizualizacyjnego). Wszystkie przeciwciała i odczynniki w formie gotowej do użycia poza: receptor EGFR H11, przeciwciała cytokeratyna MNF 116, przeciwciała CD 117, c-kit bufor do odkrywania przeciwciał o wysokim stężeniu pH9 bufor o niskim pH, bufor o wysokim pH i bufor płuczący Wszystkie odczynniki gotowe do użycia muszą pochodzić od tego samego producenta, muszą być: kompatybilne z systemem detekcji oraz być dostarczone w butelkach opatrzone kodami rozpoznawanymi przez program Autostainer - Link Zestaw farmakodiagnostyczny do oznaczenia ekspresji receptora HER-2 u pacjentów z rakiem sutka i rakiem żołądka powinien być zaaprobowany przez FDA (certyfikat PMA) Wszystkie odczynniki oraz ich procedury barwienia muszą zapewniać możliwość barwienia automatycznego i manualnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odpłatne wydzierżawienie Zamawiającemu aparatu do barwień immunohistochemicznych na czas trwania umowy przetargowej - tj. na okres 12 miesięcy.