



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 14.08.2013 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy zestawów przeciwciał oraz odczynników do diagnostyki w zakresie immunohistochemii” - Zp/68/PN-62/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. treść Załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść pozycji nr 1-17, 19-22, 24-49, 51-54 z załącznika nr 1 do SIWZ poprzez **zmianę wielkości opakowania z 6 ml na 12 ml.**

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawy przeciwciał oraz odczynników do diagnostyki w zakresie immunohistochemii

L.p.	NAZWA	OPAK.	ILOŚĆ SZT.	CENA NETTO	PODATEK VAT	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARETOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Monoclonal Rabbit X-HER alpha Clone EP1,	12 ml	6 szt.						
2.	Monoclon Mo X-H,Progest Recepet,Clone PgR 636	12 ml	6 szt.						
3.	Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29	12 ml	4 szt.						
4.	Monoclonal Mo a Hu CD45,LCA, Clone 2B11+PD7/26	12 ml	4 szt.						
5.	Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone D33	12 ml	3 szt.						
6.	Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34BE12	12 ml	4 szt.						
7.	Polyclonal Rb a Hu CD3	12 ml	4 szt.						
8.	Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26	12 ml	4 szt.						
9.	Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2	12 ml	3 szt.						
10.	Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10	12 ml	3 szt.						
11.	Monoclonal Mo a Hu CD43, Clone DF-T1	12 ml	2 szt.						
12.	Monoclonal Mo a Hu CD79&, Clone JCB117	12 ml	2 szt.						
13.	Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124	12 ml	4 szt.						
14.	Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1	12 ml	6 szt.						
15.	Monoclonal Mo X-H Cytoker Melanosome HMB-45	12 ml	2 szt.						

16.	Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6	12 ml	2 szt.						
17.	Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4	12 ml	3 szt.						
18.	Monoclonal Mo a HU Cytokeratin, Clone MNF 116	1 ml stęż.	1 szt.						
19.	Polyclonal Rb a S100	12 ml	3 szt.						
20.	Monoclonal Mo a Vimentin, V9	12 ml	2 szt.						
21.	Polyclonal Rb a Hu Chromogranin A	12 ml	3 szt.						
22.	Monoclonal a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14	12 ml	2 szt.						
23.	Rb a Hu CD117, c-Kit	0,2ml stęż.	2 szt.						
24.	Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone AE1/AE3	12 ml	4 szt.						
25.	Polyclonal RB a Hu Prostate Specific Antigen	12 ml	2 szt.						
26.	Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4	12 ml	2 szt.						
27.	Monoclonal a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30	12 ml	4 szt.						
28.	Monoclonal a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8	12 ml	4 szt.						
29.	Monoclonal Mo a Hu Melan-A, Clone A 103	12 ml	2 szt.						
30.	Monoclonal Mx TTF-1, Clone 8G7G3/1	12 ml	3 szt.						
31.	Monoclonal MxH E-Cadherin, Clone NCH-38	12 ml	3 szt.						
32.	Polyclonal l RX-Tdt	12 ml	1 szt.						
33.	Monoclonal Mx-H Renal Cell Carcinoma, Clone SPM314	12 ml	1 szt.						

34.	Polyclonal Rb a Hu Kappa Light Chains	12 ml	1 szt.						
35.	Polyclonal Rb a Hu Lambda Light Chains	12 ml	1 szt.						
36.	Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin	12 ml	1 szt.						
37.	Monoclonal Mo a Hu BCL-6 Protein, Clon PG-B6p	12 ml	2 szt.						
38.	Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12	12 ml	2 szt.						
39.	Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B	12 ml	2 szt.						
40.	Monoclonal Mouse X-H CD5, Clone 4C7	12 ml	2 szt.						
41.	Monoclonal Rabbit X-H Cyklina D1, Clone EP12	12 ml	2 szt.						
42.	Polyclonal Rb a Helicobater Pylori	12 ml	3 szt.						
43.	Polyclonal Rb a Glial Fibrillary Acidic Protein	12 ml	1 szt.						
44.	Monoclonal Mo a Hy Cytokeratin 19, Clone RCK 108	12 ml	2 szt.						
45.	Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15	12 ml	3 szt.						
46.	Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23	12 ml	2 szt.						
47.	Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56c6	12 ml	2 szt.						
48.	Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTU	12 ml	2 szt.						
49.	Monoclonal Mo a Hu p63	12 ml	6 szt.						
50.	Monoclonal a Hu Epidermal Growth Factor Receptor, Clone H11	1 ml stęż.	1 szt.						

51.	Monoklonal a Synaptophysyna	12 ml	3 szt.						
52.	Monoclona a Hu CD15, Clone Carb-3	12 ml	1 szt						
53.	Monoklonal a Hu CEA, Clone II-7	12 ml	1 szt.						
54.	Monoklonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3	12 ml	1 szt.						
55	Ołówek do obrysowywania tkanek		1 szt.						
56.	System detekcji-odczynniki niezbędne do wykonywania badań immunohistochemicznych typu bufor o pH6,1 oraz pH9,0 oraz enzym do odkrywania antygenów,bufor do przemywania preparatów w trakcie barwienia oraz odcznniki wywołujące reakcje immunohistochemiczną zakończoną reakcją barwną		5 szt.						
57.	Kompletny zestaw odczynników do oznaczania statusu receptora HER-2 w skrawkach parafinowych metodą immunohistochemiczną. System farmakodiagnostyczny zawierający wszystkie potrzebne odczynniki (przeciwciało swoiste,wiążące,chromogen DAB,bufory do		4 szt.						

	odkrywania antygeny i płukania) op.50 testów								
58.	Bufor do odkrywania antygenów pH9	500 ml	4 szt.						
59.	Kwota wydzierżawienia aparatu do barwień immunohistochemicznych na czas trwania umowy przetargowej tj. na okres 12 miesięcy*								

* W pozycji cena netto i cena brutto wpisać należy kwotę miesięczną za wydzierżawienie aparatu, w pozycji wartość netto i wartość brutto wartość za 12 m-cy.

Zestaw wizualizujący zawierający wszystkie niezbędne do wykonania reakcji

immunohistochemicznej odczynniki.

W skład zestawu musi wchodzić:

bloker endogennej peroksydazy

system wizualizujący wolny od biotyny znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych

chromogen DAB i bufor DAB

bufor do odkrywania antygenów o pH 9-9x30 ml

bufor do odkrywania antygenów o pH 6,1-3x30 ml

bufor płuczący 4x1

litr

wzmacniacz reakcji mysich 3x40 ml

rozcieńczalnik przeciwciał

hematoksylina

Butelki o objętości 5, 12, 25, 50 ml po 25 szt do jednego zestawu do wizualizacji.

Szkiełka adhezyjne (600 szt do jednego zestawu wizualizacyjnego).

Wszystkie przeciwciała i odczynniki w formie gotowej do użycia poza:

receptor EGFR H11, przeciwciała cytokeratyna MNF 116, przeciwciała CD 117, c-kit

bufor do odkrywania przeciwciał o wysokim stężeniu pH

bufor o niskim pH, bufor o wysokim pH i bufor
płuczący

Wszystkie odczynniki gotowe do użycia muszą pochodzić od tego samego producenta,
muszą być:

kompatybilne z systemem detekcji oraz być dostarczone w butelkach opatrzone

kodami rozpoznawanymi przez program Autostainer -
Link

Zestaw farmakodiagnostyczny do oznaczenia ekspresji receptora HER-2 u pacjentów

z rakiem sutka i rakiem żołądka

powinien być zaaprobowany przez FDA (certyfikat PMA)

Wszystkie odczynniki oraz ich procedury barwienia muszą zapewniać

możliwość barwienia automatycznego i manualnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odpłatne wydzierżawienie

Zamawiającemu aparatu do barwień immunohistochemicznych na czas

trwania umowy przetargowej – tj. na okres 12 miesięcy

