

BACC tarczycy **informacja dla pacjenta**

BACC jest to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana. Oznacza to nakłucie powierzchniowo położonych narządów cienką igłą (o średnicy zewnętrznej 0.4 – 0.6 mm) w celu pobrania materiału do badania. Badanie to wykonuje się pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego (USG).

Dlaczego proponujemy Panu/Pani to badanie ?

Ponieważ ma ono szereg zalet:

- pozwala ustalić rozpoznanie w krótkim czasie dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnej operacji i zaplanować odpowiednie leczenie
- badanie jest krótkie. Czas trwania badania wynosi od 3 do 5 sekund.
- biopsja i okres po zabiegu jest praktycznie bez bólu i dlatego nie stosuje się znieczulenia,
- nie jest wymagane specjalne przygotowanie,
- badanie może być wykonane u pacjentów obciążonych innymi chorobami,
- badanie nie wymaga pobytu w szpitalu,
- zaburzenia w układzie krzepnięcia, z uwagi na stosowanie cienkich igieł, nie są przeciwwskazaniem do BACC,
- Według danych z piśmiennictwa BACC nie powoduje rozsiewu czy nasilenia postępu nowotworu.

Ograniczenia metody:

- nie pozwala na badanie tkanek (histologiczne), a jedynie na badanie komórek (cytologiczne).
- Wymaga współpracy pacjenta i nie może być wykonane u pacjentów pobudzonych

Możliwe powikłania:

- w miejscu wkłucia może zrobić się krwiak (szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia)
- w wyjątkowych przypadkach mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca

Przed badaniem :

- przeczytać informację o badaniu (ta informacja) oraz informację o formularzu zgody (osobny druk)
- podpisać formularz zgody na badanie
- zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną (skierowanie na badanie, poprzednie USG, wypisy ze szpitala, konsultacje, informacja o przyjmowanych lekach itp.)

Jak wygląda badanie:

- najpierw lekarz za pomocą aparatu USG odnajdzie zmianę wymagającą nakłucia
- w czasie nakłucia nie można przełykać śliny i mówić (przez około 3- 5 sekund)
- pobrany materiał zostanie przesłany do badania do Zakładu Patomorfologii tutejszego Szpitala w celu badania cytologicznego

Postępowanie po badaniu:

- na miejsce nakłucia zostanie założony opatrunek
- Należy silnie ucisnąć miejsce nakłucia przez 5 minut (przy zaburzeniach krzepnięcia 10 minut) aby zapobiec powstaniu krwiaka.
- Opatrunek można zdjąć po godzinie.
- Wynik badania otrzyma Pan/Pani po 10 dniach w rejestracji poradni (tel. 8871679)
- Z wynikiem proszę zgłosić się do swojego lekarza. Wynik badania należy interpretować razem z wywiadem, badaniem klinicznym oraz badaniami dodatkowymi.

Opracował dr n. med. Adam Majewski www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych 2004

Opracowano na podstawie:

- Białek EW, Jakubowski W: Ultrasonografia diagnostyczna tarczycy ...; Roztoczańska Szkoła USG Zamość 2004
- Jakubowski W red. : Standardy Badań USG; Roztoczańska Szkoła USG Zamość 2003
- Kondusz-Szklarz M: Ulotka informacyjna o badaniach endoskopowych, Wałbrzych 2003